© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

dea, decollata, fuscescenti-cinerea, seriebus macularum fuscarum obsolete cincta. Anfractus superstites 5 convexi, sutura profunda crenulata discreti, liris spiralibus striisque costelliformibus confertissimis infra suturam distinctioribus subreticulati, regulariter crescentes, ultimus vix major, basi rotundatus, antice subsolutus. Apertura ovata, supra angulata, fere verticalis, peristomate continuo, undique soluto, subincrassato, vix expanso.

Alt. 12, diam. 6, alt. apert. obl. 4 mm.

Var. *sericea*, differt a typo colore saturatiore, liris spiralibus minus distinctis, sutura albosignata.

Hab. Cap Haiti.

12. *Helicina Haitensis* n.

Testa imperforata, depresse globosa, obtuse angulata, subtranslucida, lutescenti-fusca, subtilissime striatula, nitens. Anfractus 4$^1/_2$ vix convexiusculi, sutura primum lineari dein impressa et sub lente subcrenulata discreti, sat celeriter sed regulariter crescentes, ultimus obtuse angulatus, basi convexiusculus, in umbilici loco tantum leviter depressus, antice brevissime deflexus. Apertura obliqua semiovata, parum lunata, peristomate simplici, albo, marginibus distantibus, externo stricto, depresso, basali subhorizontali, cum columellari brevissimo verticali angulum fere rectum formante, columellaris callo tenui, translucido, expanso, infra sulco definito, cum insertione externi conjunctus.

Diam. maj. 8,5, min. 7,5, alt. 6 mm.

Hab. Sanssouci insulae Haiti borealis.

Literaturbericht.

Ancey, *C. F.*, *Description de Mollusques terrestres.* In le Naturaliste (2) Année 10 p. 213.

Neu Caecilianella advena aus Lüderitzland, Cyclophorus sericatus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

von den Sangirinseln und Pomatias euconus nebst var. platygyrus vom Dschebel Ischkeul bei Bizerta in Tunis. Die beiden letzteren Arten sind im Holzschnitt abgebildet.

Folin, Marquis de Observations sur l'Helix constricta Bonbcé. In le Naturaliste p. 240.

Der Autor gibt eine Aufzählung der bekannten Fundorte dieser merkwürdigen Schnecke und macht auf einige bisher übersehene Punkte bezüglich der Schale und des Thieres aufmerksam.

Eingegangene Zahlungen.

Gottschalk, B. Mk. 6.—; Schneider, B. 11.85; v. Lasser, T. 6.—; Metzger, M. 6.—; Fitz-Gerald, F. 6.—; Reuleaux, M. 6.—; Knoche, H. 6.—

Anzeigen.

Binnenconchylien des griechischen Faunengebietes (Festland und Archipel)

haben wir die reiche Ausbeute der Herren Hermann Freiherr von Maltzan und Eberhard von Oertzen, welch Letzterer den Archipelagus im Auftrage der Academie der Wissenschaften bereiste, erworben. Wir verwenden das Material vorerst zur Zusammenstellung ganzer Sammlungen; eine solche enthält die folgenden Gattungen, wobei die vorstehende Zahl die Arten- und Varietätenzahl angibt:

1 **Daudebardia,**
5 **Hyalina,**
1 **Zonites,**
3 **Leucochroa,**
45 **Helix,**
1 **Stenogyra,**
5 **Cionella,**
8 **Pupa,**
120 **Clausilia,**
1 **Succinea,**
1 **Alexia,**
3 **Limnaea,**
4 **Planorbis,**
1 **Ancylus,**
5 **Melanopsis,**
1 **Cyclostoma,**
1 **Pomatias,**
1 **Paludina,**
1 **Bythinia,**
2 **Amnicola,**
2 **Hydrobia,**
5 **Neritina.**

Die Bestimmung des Materials ist eine absolut sichere, so dass eine derartige Sammlung selbst den strengsten wissenschaftlichen Anforderungen dient. Die meisten Arten werden in je mehreren Exemplaren in einer Sammlung vertreten sein.

Vollständige Suiten können nur in wenigen Exemplaren abgegeben werden, und ersuchen wir daher die Herren Interessenten ihre Bestellungen danach zu richten.

Der Preis einer derartigen Sammlung stellt sich auf Netto **Mk. 150.**

Linnaea,
Naturhistorisches Institut
Berlin — Louisenplatz 6.